

## MELISSA OFFICINALIS

**Nome científico:** *Melissa officinalis* L.

**Sinonímia Científica:** *Melissa altissima* Sibth e Sm.; *Melissa cordifolia* Pers.; *Melissa foliosa* Opiz.; *Melissa graveolens* Host.; *Melissa hirsuta* Hornens.; *Melissa occidentalis* Rafin.; *Melissa romana* Mill. *Melissa bicornis* Klokov.

**Nome popular:** Melissa, Melissa Verdadeira e Erva Cidreira.

**Família:** Lamiaceae.

**Parte Utilizada:** Folha e caule

**Composição Química:** Padronizado em 5% de Ácido Rosmarinico, Óleo Essencial: linalol, nerol, geraniol, citronelol,  $\alpha$ -terpineol, terpineno-1-4-ol, neral, geranal, cariofilenol, farnesol, 10-epi- $\alpha$ -cadinol,  $\alpha$ -cubebeno,  $\alpha$ -copaeno,  $\beta$ -burboneno,  $\beta$ -cariofileno,  $\alpha$ -humuleno, 1,8-cineol, óxido de cariofileno e ocimenos; Flavonóides: luteolol-7-glicosídeo, ramnocitrosídeo, apigenina e quercitrosídeo; Ácidos Carboxílicos: cafêico, clorogênico, elágico e rosmariníco; Taninos; Princípio Amargo; Mucilagens Urônicas.

**Formula molecular:** N/A

**Peso molecular:** N/A

**CAS:** N/A

**DCB:** N/A

**DCI:** N/A

Planta originária da região que circunda o Mediterrâneo e também a Ásia, *Melissa officinalis* L., conhecida popularmente como erva-cidreira, é uma planta da família Lamiaceae, arbustiva, que pode atingir de 20 a 80 cm de altura. Os caules, ramificados a partir da base, formam touceiras. As folhas são verde-intensas na parte superior e verde-claras na parte inferior. As flores, quando surgem, são brancas ou

### Vendas

(19) 3429 1199

Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florian.com.br](mailto:vendas@florian.com.br)

[www.florian.com.br](http://www.florian.com.br)

amareladas, podendo tornar-se rosadas com o passar do tempo. Toda a planta emana um odor semelhante ao do limão, que se torna mais intenso na planta seca.

### Indicações e Ação Farmacológica:

O ácido rosmarínico da *Melissa officinalis* é um dos principais componentes implicado com sua resposta farmacológica. É indicada na inapetência(ausência do apetite), na gastrite, nos espasmos gastrintestinais, nas disquinesias hepatobiliares, meteorismo(presença exacerbada de gases no trato gastrointestinal), nas coleocistites, nas diarréias, na ansiedade, na insônia, na hipertensão arterial, na taquicardia, na enxaqueca, na asma, na dismenorréia, em feridas, no hipertiroidismo e herpes simples. Também apresenta efeito sedativo e ligeiramente hipnótico, e antioxidante.

**Efeito antiviral:** Um ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado com placebo, avaliou o efeito antiviral do extrato aquoso de *Melissa officinalis* em 116 pacientes com infecção de HSV (herpes) da pele ou da mucosa de transição. Houve melhora estatisticamente significativa do grupo tratamento em relação ao grupo placebo.

**Efeito sedativo:** *M. officinalis* pode modular várias medidas de comportamento, como um moderado sedativo em transtorno do sono, na atenuação de sintomas de desordens nervosas, inclusive a redução de excitabilidade, ansiedade, e tensão. Em estudo pré-clínico em camundongos, foi administrado um extrato hidroalcoólico de folhas de *M. officinalis*, houve redução significativa da atividade comportamental em dois testes em comparação com o controle, o que sugere que o extrato apresenta efeito sedativo.

### Vendas

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florian.com.br](mailto:vendas@florian.com.br)  
[www.florian.com.br](http://www.florian.com.br)

## Toxicidade/Contraindicações

O óleo essencial de Melissa se comporta como neurotóxico e mutagênico em doses elevadas. O linalol e o terpineol produzem um efeito depressor do sistema nervoso central e em altas doses provocam quadros narcóticos. Ocasionalmente pode produzir hipertensão arterial em doses normais por vasodilatação periférica. É contra-indicado o uso de óleo essencial de Melissa durante a gravidez, lactação, para crianças menores de seis anos de idade, pacientes com gastrite, úlceras gastroduodenais, síndrome do cólon irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, epilepsia, afecções hepáticas, doença de Parkinson ou outra enfermidade de cunho neurológico. Não fazer uso tópico em crianças menores de seis anos e pessoas com alergia conhecida a óleos essenciais.

## Dosagem e Modo de Usar

- **Extrato seco 5%:** 500 mg, 2 vezes ao dia.
- **Pó:** 400 mg 3 vezes ao dia.
- **Rasura:** Uma colher de sobremesa por xícara, infundindo por 10 minutos. Tomar 3 ou mais xícaras por dia.
- **Extrato fluido:** 2 a 4 ml três vezes ao dia.
- **Tintura:** 2 a 6 ml três vezes ao dia.
- **TM:** 40 a 50 gotas, três vezes ao dia.

## Referências Bibliográficas

ALBINO, R. **Pharmacopéia dos Estados Unidos do Brasil.** 1<sup>a</sup> edição. 1926.

ALONSO, J. R. **Tratado de Fitomedicina.** 1<sup>a</sup> edição. Isis Editora. 1998.

### Vendas

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florian.com.br](mailto:vendas@florian.com.br)  
[www.florian.com.br](http://www.florian.com.br)

**PR Vademecum de Prescripción de Plantas Medicinales.** (CD-ROM). 3<sup>a</sup> edição. 1998.

**SOARES, A. D. Dicionário de Medicamentos Homeopáticos.** 1<sup>a</sup> edição. Santos.

**TAIWO, A. E. Alterações comportamentais decorrentes da administração de *Melissa officinalis*, em ratos.** Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. 2007.

**BARNES, J. ANDERSON, L. A. FHIILLIPSON, J. D; Fitoterápicos.** 3.ed Porto Alegre.2012.

**TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. Herbarium compêndio de fitoterapia.** 3 ed. Curitiba, 1997.

#### **Vendas**

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florien.com.br](mailto:vendas@florien.com.br)  
[www.florien.com.br](http://www.florien.com.br)

